Acerca de este folleto

El presente folleto está dirigido al público en general para destacar un de suma importancia a menudo es pasado por alto, y para servir de fuente de información e inspiración.

El material aquí presentado se basa en una gran cantidad de trabajo de muchas instituciones y científicos de todo el mundo, que investigan especies marinas invasoras y desarrollan mecanismos para prevenir, gestionar y mitigar las invasiones biológicas. Su trabajo es reconocido con gratitud.

Amenaza marina – un resumen sobre la cuestión de las especies marinas invasoras

Más del 70% de la tierra está cubierta por océanos y mares mayores y hay más de 1,6 millones de kilómetros de costa. Nuestros hábitats marinos son biológicamente ricos y variados en extremo, desde las aguas costeras poco profundas hasta las fosas oceánicas. Las personas dependen de muchas maneras de los recursos proporcionados por los océanos y las costas para su supervivencia y bienestar. Para más de mil millones de personas los peces constituyen su principal fuente de proteína animal. Otros recursos marinos como los mariscos y las algas les proporcionan medios de vida mediante la cosecha sostenible, mientras que el turismo costero genera empleo e ingresos. Sólo en los Cayos de la Florida el turismo relacionado con los arrecifes genera más de US$1200 millones cada año.

Sin embargo, nuestro mundo marino está en peligro: la explotación excesiva de sus recursos, la destrucción del hábitat, la contaminación y el cambio climático están impulsando la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podría decirse que la peor amenaza es la de las especies marinas invasoras.

Los hábitats marinos están poblados por diferentes especies de animales, plantas y microorganismos que han evolucionado en aislamiento, separados por barreras naturales. Pero el ser

Grandes y pequeños

Los organismos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueden convertirse en invasores. Algas microscópicas japonesas se han encontrado recientemente en el Mar del Norte, mientras que cangrejos exóticos gigantes del Pacífico, de más de un metro de largo, deambulan frente a la costa noruega (véase los estudios de caso en la p. 19). En todo el mundo, peces, cangrejos, mejillones, almejas, medusas, corales, ascidias, algas marinas, pastos marinos o cañizo, así como agentes patógenos microscópicos perjudiciales para la salud son sólo algunas de las formas de vida que han causado estragos tras su introducción. Los impactos de las invasiones marinas son de gran alcance: las plantas de pueden colonizar amplias zonas de marismas y estuarios, destruyendo colonias de mariscos (véase el estudio de caso en la p. 29); el alga caulerpa puede hacer lo mismo en el lecho marino; los cangrejos verdes europeos son depredadores voraces que se alimentan de la vida marina en el mundo entero, y enjambres de medusas venenosas están formando un «cinturón de medusas" frente a la costa de Israel. En muchas zonas, el cambio climático probablemente favorecerá a las especies introducidas, pudiendo, incluso, intensificar sus impactos.

Ni siquiera las áreas marinas protegidas están fuera de peligro. El aumento de visitantes a estas áreas significa que están en mayor riesgo de invasiones biológicas. Muchas áreas ecológicamente ricas han sufrido por las invasiones de especies marinas. El Mar de Wadden es el mayor tramo continuo de marismas en todo el mundo y el humedal más grande de Europa. En los últimos 100 años, ha sido invadido por muchas especies exóticas. Un caso similar se está repitiendo desde los mares del Báltico y el Ártico y el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo, desde los arrecifes de coral tropicales hasta las costas meridionales de Tasmania en Australia. Hasta la Antártida ha sido presa de especies marinas exóticas.

Aunque el panorama puede parecer desolador, hay muchas maneras de luchar. Es mucho más difícil erradicar una especie exótica en el entorno marino que en tierra, pero no es imposible. Si la erradicación no fuera posible, se podría aplicar algún tipo de control, si bien tendría que ser permanente. En todos los casos, siempre es mejor prevenir la introducción. La prevención por medio de la gestión del agua de lastre está ganando terreno a nivel internacional y nuestra capacidad para evaluar los riesgos,

Impactos de las invasiones

Se calcula que hay 500 especies exóticas marinas en las aguas costeras de los EE. UU. Solamente en la Bahía de San Francisco se encuentran alrededor de 200. A nivel mundial el número es mucho mayor. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué debemos preocuparnos, cuando muchas de las especies exóticas introducidas intencionalmente nos proporcionan comida, recreación o empleos? La respuesta es que si bien muchas de las especies que se introducen en un nuevo entorno no causan daño, muchas otras repercuten negativamente en la ecología, la economía y la salud de las personas. Las algas marinas invasoras han asfixiado lechos marinos; los cangrejos invasores merodean en el fondo del mar comiéndose todo lo que encuentran a su paso; las medusas invasoras han provocado el colapso de pesquerías y gente ha muerto por agentes patógenos trasladados en el agua de lastre. A veces los impactos ocurren de manera rápida y dramática, pero la mayoría de las veces son indirectos y sutiles y pueden pasar desapercibidos por un tiempo.

Pérdida de la biodiversidad nativa, debido a:

– depredación de especies nativas

– disminución del hábitat disponible para las especies nativas

– competencia adicional

– parásitos y enfermedades

– crecimiento excesivo y asfixia

Ejemplos de los daños causados por los invasores marinos

La medusa del Mar Rojo ( ) entró al Mediterráneo a través del Canal de Suez. Cada verano, enjambres enormes aparecen a lo largo de las costas del Mediterráneo Oriental. En ciertos momentos hay 25 medusas por metro cuadrado formando un «cinturón de medusas» a aproximadamente 1 km de la costa. Esto está repercutiendo de manera significativa en la pesca y en la infraestructura costera. La pesca costera se interrumpe mientras dura el enjambre debido a la obstrucción de las redes y la imposibilidad de clasificar la pesca. En las dos plantas de energía más grandes de Israel se tienen que remover toneladas de medusas de las entradas de

Culpable hasta comprobar su inocencia

No todas las especies exóticas se vuelven invasoras. La cuestión es predecir cuáles lo harán. Incluso las especies que al principio pueden parecer «inofensivas» se pueden convertir en invasoras si se da un cambio idóneo en las condiciones locales. Esto podría incluir la introducción de otra especie exótica, cambios en el medio ambiente u otros factores que le den una ventaja biológica. Debido a que estos cambios pueden ocurrir ya sea después de mucho tiempo o súbitamente, cualquier nueva introducción al entorno local debe ser objeto de estrecha vigilancia. Considerando la devastación causada por las especies exóticas que sí se vuelven invasoras, es necesario tratar con cautela a las especies exóticas –cualquier especie exótica debe ser considerada «culpable hasta comprobar su inocencia».

rutas y vectores –¿cómo se introducen las especies marinas?

introducciones involuntarias

– La transferencia de agua de lastre, principalmente asociada a los grandes buques y
– El ensuciamiento de los cascos, asociado con buques, yates y embarcaciones pequeñas

– Ensuciamiento de boyas
– Transporte en equipo de pesca o buceo
– Transporte en embarcaciones de recreo u otros botes pequeños
– Agentes patógenos exóticos en los mariscos y otras introducciones en la acuicultura

– Canales
– Proyectos de trasvase de agua

– Especies de peces liberadas para aumentar la pesca local
– Plantas introducidas para controlar marismas o dunas

– Maricultura (cría de ostras, salmón, etc. (véase estudios de caso en la p. 20-28))
– Uso en acuarios
– Comercio de mariscos vivos
– Comercio de cebo vivo para la pesca
– Algas utilizadas en empaque (por ejemplo, de cebo)

Peces y mariscos han sido introducidos intencionalmente por todo el mundo para la maricultura, el suministro de alimentos

Debido a la magnitud del problema, las especies invasoras marinas deberían ser combatidas tanto a nivel internacional y regional, como a nivel nacional y local. La gestión de las especies invasoras en el entorno marino es mucho más compleja que en la tierra. Uno de los problemas es la continuidad del entorno marino –es casi imposible cerrar un área. Cualquier tratamiento aplicado a un área, como por ejemplo un veneno, es probable que se extienda más allá de la zona objetivo. La reinvasión del área también se facilita. El trabajo bajo el agua añade un grado adicional de complejidad. Aunque ha habido algunos casos exitosos de erradicación

Es sumamente difícil controlar un organismo marino una vez establecido. Hasta la fecha sólo ha habido una erradicación exitosa de un organismo marino; la erradicación del mejillón falso de una marina en Australia. Se utilizaron productos químicos para aniquilar todo en la marina, incluyendo toda la vida marina nativa. La operación consistió en el tratamiento químico de tres puertos deportivos y 420 embarcaciones, con la participación de 270 personas (incluyendo francotiradores para proteger a los buzos de los cocodrilos), durante cuatro semanas a un costo total de 2,2 millones de dólares australianos.

Se han utilizado diversos métodos para reducir el número de especies marinas invasoras en poblaciones ya establecidas, pero si bien puede haber cierto grado de éxito en la reducción de las poblaciones, estas actividades tendrán que mantenerse indefinidamente con el consiguiente costo. El puerto de Hobart en Tasmania, Australia, ha sido invadido por la estrella de mar japonesa (, véase el estudio de caso en la p. 23-24). Se han hecho intentos para controlarla usando sustancias químicas y extracción manual, pero hasta ahora esto no ha tenido mayor impacto en su población (véase el estudio de caso en p. 25).

E pla lB-5(a)-5(h5(u)-5(a)-5(t3(e)]TJET1(()t1(l)-)-a2(i)-5(n)-)-uauilimana ma tnua1

No es exageración: La prevención debe ser la máxima prioridad. Debe intensificarse los esfuerzos para reducir y prevenir la introducción de nuevas especies al entorno marino. Se debe abordar todos los medios de introducción incluyendo la introducción intencional. Se necesita un sistema de detección temprana y respuesta rápida. Se debe abordar las especies marinas invasoras a todo nivel, desde convenios internacionales hasta acuerdos regionales, planificación nacional y a nivel local, estimulando y empoderando a las comunidades para participar. Todos los aspectos de la gestión deben basarse en el principio de la precaución. Esto significa que cualquier especie exótica debe ser considerada como un posible riesgo.

El ISSG tiene como objetivo la reducción de las amenazas a los ecosistemas naturales y las especies nativas que contienen, incrementando el conocimiento sobre las especies exóticas invasoras y las maneras de prevenirlas, controlarlas o erradicarlas. El ISSG también produce el boletín informativo «Alien», y mantiene una lista en el servidor.

El ISSG administra la Base de Datos Mundial sobre Especies Invasoras, que tiene por objeto aumentar la conciencia sobre las especies exóticas invasoras y facilitar la prevención eficaz y la gestión de actividades.

GISP es una asociación internacional cuyo objetivo es conservar la biodiversidad y sostener los medios de vida minimizando la propagación y el impacto de las especies invasoras. GISP presta apoyo para la implementación del artículo 8(h) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y ha contribuido ampliamente al conocimiento y la concientización sobre especies invasoras a través del desarrollo de una gama de productos y publicaciones.

El nódulo de información sobre especies invasoras facilita enlaces a fuentes de datos de especies invasoras, incluyendo un catálogo de los sistemas de información, bases de datos y conjuntos de datos sobre especies exóticas invasoras.

El Proyecto GBP (Creando asociaciones para ayudar a los países en desarrollo a reducir la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales en el agua de lastre de buques) ayuda a los países y regiones en desarrollo a aplicar mecanismos sostenibles, basados en riesgos para la gestión y el control

Los ecologistas y los pescadores en Noruega están advirtiendo sobre la amenaza que representa el rapidísimo avance de invasores rusos a lo largo de la costa de Noruega –el cangrejo real ( ).

La especie es nativa del Pacífico Norte alrededor de la Península de Kamchatka de Siberia, hacia el sur hasta Hokkaido en el norte de Japón, y hacia el este a lo largo de las Aleutianas hacia Alaska. Es un omnívoro voraz que come grandes cantidades de cualquier planta comestible o materia animal que encuentra, incluyendo huevas de peces y otros cangrejos. Tarda unos 10 años en madurar, puede vivir hasta los 30 años y puede alcanzar un peso de 10 kg y un tamaño de 1,5 m. No tiene depredadores naturales en Europa.

En 1960, los economistas soviéticos aprobaron la introducción del cangrejo para aumentar los niveles de pesca de la industria pesquera local. Los cangrejos se capturaban en la costa pacífica de Rusia, se transportaban por tierra y se liberaban en el Mar de Barents. Por unas dos décadas no hubo mayor cambio, pero luego, a finales de la década de 1980, los cangrejos comenzaron a extenderse al oeste, y desde 1992 la especie se ha reproducido en cantidades significativas en aguas noruegas. Desde entonces, ha llegado a la Islas Svalbard y se está extendiendo hacia el sur por la costa de Finnmark en Noruega. Se predice que el cangrejo llegará tan al sur como Portugal y ya en el año 2006 había llegado a las Islas Lofoten.

El cangrejo ha ocasionado graves problemas para la pesca local a lo largo de la costa de Barents;

El salmón del Atlántico ( ), originario del Océano Atlántico empieza su vida en lagos de agua dulce y ríos. A medida que madura va migrando al mar donde puede crecer hasta pesar cerca de 9 kg. El salmón a menudo se pesca deportivamente, particularmente en Europa, y es uno de los peces más degustados en todo el mundo. Cuando esta especie empezó a ser transportada por todo el mundo para la acuicultura, creó oportunidades laborales y beneficios económicos. Pero también ha tenido efectos negativos incluyendo la contaminación causada por la acuicultura y los impactos a las especies nativas por el escape y la hibridación, transmisión de enfermedades y competencia. El salmón del Atlántico actualmente se encuentra tan lejos como Australia, Nueva Zelanda y Chile, así como en la costa oeste de los EE. UU. y Canadá.

constituir la mayor amenaza al salmón nativo, por la competencia con el salmón nativo juvenil, así como por la depredación del salmón rosado nativo (o jorobado) y los alevines del salmón keta (o chum).

pudo haber ocurrido por larvas en el agua de lastre o ensuciamiento en buques del Japón. En 1995, la densidad poblacional en el estuario de Derwent de Tasmania resultó ser la más alta del mundo (1100 por m^3). Se estima que 30 millones de ejemplares pueden estar presentes allí.

Este voraz depredador come cualquier cosa que encuentre a su paso que no mida más que uno de sus propios brazos (hasta 50 cm). Tiene predilección por los mariscos, cangrejos, erizos de mar, otras estrellas de mar, huevas de peces y ascidias, y puede detectar y excavar cualquier presa enterrada en la arena. Desde su llegada a Tasmania, la estrella de mar japonesa se ha convertido en la principal depredadora de invertebrados en el estuario de Derwent. La estrella de mar nativa no está en condiciones de competir en nflobger eyentá -5(

su hábitat a varias especies nativas de mejillones, reproduciéndose mucho más rápido que las

cultivada en algunas zonas de Australia, es considerada una plaga en otras. Del mismo modo, en los Países Bajos esta especie se utiliza para la maricultura, pero en el Mar de Wadden en donde se ha establecido “en el medio silvestre”, es vista como una posible amenaza ecológica debido a su capacidad de generar arrecifes sólidos y competir con especies nativas. También causa daños económicos, ensuciando y obstruyendo tuberías de entrada e interfiriendo con sistemas de refrigeración central.

Muchos organismos han viajado con las ostras y se han introducido involuntariamente, incluyendo

Spartina
una invasora insidiosa

las marismas abiertas. En otras partes de los EE. UU., donde la no es nativa, como en la Bahía de San Francisco, se combinó con diferentes especies nativas de , amenazando la flora nativa en zonas pantanosas. Estos híbridos son más resistentes que sus "antepasados", como resultado de lo cual son mejores invasores. La propagación de híbridos entre la atlántica y la nativa en el Reino Unido es otro caso bien conocido de invasión de plantas por hibridación.

Una sencilla pero muy eficaz estrategia para combatirla, es mediante la identificación temprana de recién llegados de la invasora a sitios valiosos, estudiando las zonas vulnerables y eliminando las invasoras antes de que se propaguen. Varios métodos han sido utilizados para eliminar infestaciones mayores. En áreas pequeñas es factible hacerlo recurriendo a la asfixia, la quema, el entierro y la excavación de la hierba. Las áreas más grandes son generalmente tratadas con herbicidas cuando ello es posible y aceptable. El Departamento de Agricultura del Estado de Washington (EE. UU.) aprobó la introducción de un salta-plantas (un grupo de insectos que se asemejan a las hojas de la planta y brincan como saltamontes) en la xcomo agente de control biológico contra .

La historia del cólera

El cólera es una de las enfermedades mortales más conocidas. Producida por diversas cepas de la bacteria , los síntomas de la enfermedad varían de diarrea leve a aguda acompañada de calambres abdominales, náuseas, vómito, deshidratación y conmoción. En los casos más graves, una persona sana puede deshidratarse en menos de una hora de la aparición de los síntomas y puede fallecer dos horas después. Afortunadamente para la mayoría de las personas, los avances del siglo XX en cuestiones de salubridad, higiene, eliminación de residuos, manipulación de alimentos y abastecimiento de agua doméstica, han resultado en una disminución significativa de la enfermedad.

Entonces, ¿por qué hablar de esta enfermedad en un libro que versa sobre plantas y animales marinos invasores? La respuesta es que la bacteria del cólera no ha desaparecido. Como la mayoría de los patógenos humanos son capaces de mutar en nuevas cepas y provocar epidemias. También son capaces de "viajar" extensamente en el agua de lastre de los buques.

En la década de 1980, apareció una nueva cepa de , posiblemente en Indonesia, y epidemias locales brotaron en gran parte de Asia oriental. En 1991, un buque procedente de Asia llevó una nueva cepa virulenta de la enfermedad hasta el puerto de Lima en Perú, probablemente por medio de agua de sentina contaminada. La bacteria pronto infectó los mariscos y luego se propagó a los seres humanos, alcanzando rápidamente proporciones de epidemia. Solamente en el Perú ha habido un millón de casos de cólera y hasta 10.000 muertes.

Tilapia (.) es el nombre común dado a más de 70 especies de peces, de las cuales al menos ocho son utilizadas para la acuicultura. La tolerancia a la temperatura del agua y la salinidad varía mucho entre especies. La tilapia nilotica ( ) es la menos tolerante al frío y prefiere los climas tropicales a los subtropicales, mientras que la tilapia azul ( ) es capaz de tolerar temperaturas tan bajas como 8-9°C, por lo que es más dada a establecerse en los países con pronunciadas variaciones estacionales de temperatura. La tilapia generalmente vive en agua dulce, pero algunas especies e híbridos pueden tolerar

UNIÓN INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA